

Goat's Foot Creeper

In Thai : Phak Boong Ta-Lae

ผักบูงทะเล



In Thailand. Local people living in coastal areas. And from the experience of being told that poisonous jellyfish. Ipomoea (Goat's Foot Creeper) toxic jellyfish that can keep up. How to use Ipomoea leaves. Lower or rub the area thoroughly plaster being poisoned. But only if you can squeeze water from the paint area, separate water only hit the toxic jellyfish. It reduces pain and inflammation. The Ipomoea it should be washed thoroughly before use because Ipomoea up along the coast. In particular, in the community or city may have sewage. Or contaminated dirt.

สำหรับในประเทศไทยผู้คนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และจากคำบอกเล่าประสบการณ์ของผู้ที่โดนพิษของแมงกะพรุนนั้น พบว่าผักบูงทะเลสามารถรักษาพิษของแมงกะพรุนได้ วิธีการใช้โดยนำใบผักบูงทะเล มาตำหรือขี้ไว้ละเอียดพอกับบริเวณที่โดนพิษ แต่หากสามารถคั้นเอาแต่น้ำได้ให้คั้นเอาแต่น้ำมาทาบริเวณที่โดนพิษของแมงกะพรุน จะช่วยลดอาการปวดและการอักเสบได้ การนำผักบูงทะเลมาใช้น้ำมันกระล้างให้สะอาดก่อน เพราะผักบูงทะเลที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่ง โดยเฉพาะในที่ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวนั้นอาจมีสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งสกปรกต่างๆ ปนเปื้อนอยู่

